Servizio idrico nella bassa pianura veneta: problematiche e interventi dovuti alle mutazioni climatiche e agli inquinanti di nuova generazione

LO STATO QUANTITATIVO DELLA RISORSA IDRICA

Geol. Massimo Mazzola
Centro Servizi Idrogeologici
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

LO STATO QUANTITATIVO DELLA RISORSA IDRICA

- Il ciclo dell'acqua e il bilancio idrologico
- Il sistema idrologico Veneto
- Lo stato delle risorse e le tendenze in atto
- Cambiamenti climatici: cosa aspettarsi per il futuro?

DISPONIBILITA' DELLA RISORSA IDRICA

QUANTITA'

QUALITA'

DISPONIBILITA'

USI PRINCIPALI DELLA RISORSA

**LA CRITICITA' NELLA DISPONIBILITA' DELLA RISORSA IDRICA
DEVE ESSERE VALUTATA SOPRATTUTTO IN RAPPORTO AI
FABBISOGNI**

Usi idropotabili

Usi irrigui

Usi industriali

Usi energetici

Rilasci ecologici

APPROVVIGIONAMENTI IDROPOTABILI

arpav

In Veneto: 90% da fonti sotterranee (pozzi e sorgenti) e solo il 10% da acque superficiali.

827 milioni di mc
prelevati
dall'ambiente
circa
60% da pozzo
30% sorgente
10% acque superficiali

1000 centrali
acquedotto

46200 km di rete
(adduzione + distribuzione)

IL CICLO DELL'ACQUA E IL BILANCIO IDROLOGICO

IL CICLO DELL'ACQUA

PERCIPITATION, DEPOSITION / DESUBLIMATION

Water droplets fall from clouds as drizzle, rain, snow, or ice.

ACCUMULATION, SNOWMELT, MELTWATER, SUBLIMATION, DESUBLIMATION/DEPOSITION

Snow and ice accumulate, later melting back into liquid water, or turning into vapor.

ADVECTION

Winds move clouds through the atmosphere.

CONDENSATION, CLOUDS, FOG

Water vapor rises and condenses as clouds.

SURFACE RUNOFF, CHANNEL RUNOFF, RESERVOIRS

Water flows above ground as runoff, forming streams, rivers, swamps, ponds, and lakes.

EVAPORATION

Heat from the sun causes water to evaporate.

PLANT UPTAKE, INTERCEPTION, TRANSPIRATION

Plants take up water from the ground, and later transpire it back into the air.

HYDROSPHERE, OCEANS

The oceans contain 97% of Earth's water.

INFILTRATION, PERCOLATION, SUBSURFACE FLOW, AQUIFER, WATER TABLE, SEEPAGE, SPRING, WELL

Water is soaked into the ground, flows below it, and seeps back out enriched in minerals.

VOLCANIC STEAM, GEYSERS, SUBDUCTION

Water penetrates the earth's crust, and comes back out as geysers or volcanic steam

The Water Cycle

Water moves around our planet by the processes shown here. The water cycle shapes landscapes, transports minerals, and is essential to most life and ecosystems on the planet.

Il ciclo dell'acqua è solo parte di complesso sistema dinamico a scala planetaria in cui è **la temperatura rappresenta il driver fondamentale**

IL SISTEMA IDROLOGICO VENETO

Groundwater Resources of Europe

Reykjavik

Dublin

Birmingham

London

Amsterdam

Rotterdam

Paris

Brussels

Prague

Munich

Vienna

Budapest

Milan

Turin

Marseille

Barcelona

Rome

Naples

Lisbon

Madrid

Algiers

Tunis

Rabat

Casablanca

Tripoli

Benghazi

Alexandria

Tel Aviv-Yafo

Jerusalem

Cairo

Damascus

Beirut

Aleppo

Smyrna

Ankara

Bursa

Istanbul

Yerevan

Tabriz

Baku

Asgh

Jeddah

Mec

Mumansk

Oslo

Stockholm

Helsinki

Saint Petersburg

Arkangelsk

Nizhny Novgorod

Moscow

Kazan

Pem

Ufa

Chelyabinsk

Yekaterinburg

Samara

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

Copenhagen

Brno

Prague

Bucharest

Belgrade

Sofia

Odesa

Odessa

Volgograd

Astrakhan

Rostov-na-Donu

Dnipropetrovsk

Kharkiv

Kyiv

Minsk

Warsaw

Berlin

Hamburg

CONCETTI FONDAMENTALI:

L'intera pianura veneta (padana) è satura d'acqua

La grande consistenza di questa risorsa deriva principalmente dalla coincidenza di due fattori:

- L'assetto geologico-strutturale particolarmente favorevole
- Gli strettissimi rapporti di interdipendenza tra acque superficiali e sotterranee, che consentono efficaci azioni di alimentazione e ricarica.

Il sistema Idrogeologico Veneto

L'area più importante è l'area di ricarica corrispondente all'alta pianura. Essa influisce in modo determinante sull'intero sistema idrogeologico. E' in quest'area che i corsi d'acqua superficiali perdono per infiltrazione gran parte della loro portata.

- Alta Pianura = acquifero indifferenziato con falde freatiche e area di ricarica.
- Media Pianura = fascia delle risorgive con acquifero differenziato con falde in pressione.
- Bassa pianura = zona di esaurimento delle falde in pressione (per perdita di carico).

FATTORI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA SOTTERRANEO

Da CNR 2000 modificato

Le fonti di prelievo sono **714**:

528 superficiali

186 sotterranee

Circa 5.000 ML di m³

LO STATO DELLE RISORSE E LE TENDENZE IN ATTO

LE RISORSE DI ACQUE DOLCI IN VENETO:

- **ACQUE SOTTERRANEE**
- **ACQUE SUPERFICIALI (FIUMI e LAGHI)**
- **GHIACCIAI E INNEVAMENTO**

Come misurare lo stato delle risorse?

Temp. +

Neve

Pioggia

Falda

Volume Laghi

Portata

LE PRECIPITAZIONI

LE PRECIPITAZIONI

Sono stati utilizzati i dati di circa 160 stazioni pluviometriche di ARPAV, spazializzati con il metodo di Kriging ordinario

LE ACQUE SOTTERRANEE

Castelfranco Veneto quota falda (media mensile) 1940 - 2017

Ultimi 11 anni

Ultimi 20 anni

FIUME	PORTATA MEDIA (MC/S)	LUNGHEZZA (KM)	BACINO (KMQ)
PO	1540	652	71000
ADIGE	235	410	12200
PIAVE	125	231	4127
BRENTA	93	174	5840
LIVENZA	85	112	2221
BACCHIGLIONE	30	94	1400
GORZONE	26	70

Riduzione della superficie glacializzata e degradazione del permafrost

2007

1999

1986

1875

La superficie glacializzata delle Dolomiti si è ridotta di circa il **49%** negli ultimi 100 anni con un'accelerazione della fase di ritiro a partire dal 1980; il permafrost si è ridotto a soli **2,2 km²**

CAMBIAMENTI CLIMATICI

COSA ASPETTARSI PER IL FUTURO?

CAMBIAMENTI CLIMATICI OSSERVATI IN VENETO

Andamento delle temperature medie negli ultimi 26 anni in Veneto

L'andamento dell'ultimo ventennio delle temperature medie annue registra un trend in deciso aumento (+1.3 ° C in 25 anni).

Temperatura media annua delle massime

media ponderata sul Veneto dei valori di 48 stazioni termometriche

TREND - media su 48 stazioni

Tmax **anno**: **+1.8 °C/50 anni**

Tmax **primavera**: **+1.9 °C/50 anni**

Tmax **estate**: **+2.3 °C/50 anni**

Tmax **autunno**: **+0.7 °C/50 anni**

Tmax **inverno**: **+2.3 °C/50 anni**

CAMBIAMENTI CLIMATICI OSSERVATI IN VENETO

TEMPERATURA MASSIMA

**VARIAZIONE DELLA T MAX (°C)
1991 - 2004/1961 - 1990
MEDIA ANNUA**

I CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLA REGIONE VENETO

- TREND DELLE PRECIPITAZIONI (1993-2017)

Le precipitazioni del 2010 e del 2014 rappresentano dei massimi assoluti, non solo della serie 1993-2017, ma anche degli ultimi 60 anni.

CAMBIAMENTI CLIMATICI OSSERVATI IN VENETO

L'estate 2012 ci ha fatto toccare con mano quanto possa essere grave anche da noi il rischio siccità

Fiume Adige – aprile 2017

Fiume Piave - giugno 2017

Cosa succede alla foce del fiume Adige per portate inferiori a circa $80 \text{ m}^3/\text{s}$

ANNI 50' – 60'

Risalita del cuneo salino

ANNI 70' – 80' Risalita del cuneo salino

ANNI 2000 Risalita del cuneo salino

ALCUNI DATI SUL LIVELLO MEDIO DEL MARE IN ALTO ADRIATICO (con possibili trend futuri) E SULLA SUBSIDENZA DEL DELTA DEL PO

L'innalzamento del livello del mare nell'Adriatico nell'ultimo secolo è stimato in circa 13 cm (riferito a Trieste) ed è inferiore a quello stimato su scala globale per il XX secolo pari a 17 cm

La subsidenza naturale nel Delta del Po è stimata in circa 4 mm/anno

Dal 1950 al 1970 l'abbassamento medio del territorio del Delta del Po è stato di 200 cm, con punte di 300 cm

CAMBIAMENTI CLIMATICI PREVISTI

TEMPERATURA

INVERNO

+3°C

PRIMAVERA

+2/3°C

ESTATE

+3/4°C

AUTUNNO

+3/4°C

°C

Medie Tmax

Medie Tmin

Tmax estreme

Ondate di caldo

(E.Bucchignani et al., 2016)

CAMBIAMENTI CLIMATICI PREVISTI

PRECIPITAZIONI

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

- 1/2 mm/g

Totali annue

Totali invernali

Totali autunnali

Piogge intense

↓ (Non sign.)

↑ (Non sign.)

↑ (Alcuni casi)

...e la tempesta Vaia?

Si è trattato di un evento eccezionale ? SI

Evento pluviometrico con cumulate di magnitudo complessivamente superiori a quelle del 1966

Venti di intensità mai sperimentata su scala vasta nelle alpi orientali

CONCLUSIONI

*I dati dei monitoraggi ARPAV segnalano che le temperature medie dell'aria registrate in Veneto sono in aumento. Tale informazione è coerente sia con i trend registrati a scala continentale che planetaria. Anche se in passato il clima della Terra è cambiato più volte, quello che è nuovo è la **crescente velocità del cambiamento**;*

Tale variazione ha effetto anche nel sistema idrologico i cui effetti più evidenti si traducono con un aumento degli eventi estremi e con una forte riduzione della superficie glacializzata;

*L'aumento delle temperature in Veneto inciderà solo in parte nelle disponibilità idriche ma **porterà ad un aumento degli utilizzi idropotabili, irrigui ed energetici con un aumento dei conflitti già in atto** tra gli utilizzi e le esigenze (irrigue, sanitarie, energetiche, paesaggistiche, turistico-ricreative e ambientali).*

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

RAPPORTO SULLA RISORSA IDRICA IN VENETO

1.1.1

AL 31 GENNAIO 2014

- INDICE	pag. 1
- Sintesi della situazione	pag. 2
- Precipitazioni del mese (mm) e bilancio idroclimatico (P-ETP)	pag. 3
- Precipitazioni del mese medie per bacino idrografico (limitatamente alla parte Veneta) e per l'intero territorio regionale	pag. 4
- Stima degli afflussi del mese (Mm ³) sul territorio regionale	pag. 4
- Indice SPI (Standardized Precipitation Index) calcolato sulla base dei dati pluviometrici del periodo 1994 - 2017 e riferito agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi	pag. 5
- Precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno idrologico (1° ottobre 2017) medie per bacino idrografico (limitatamente alla parte veneta) e per l'intero territorio regionale	pag. 6
- Stima degli afflussi (Mm ³) dall'inizio dell'anno idrologico (1° ottobre 2017)	pag. 7
- Dati mensili di precipitazione riferiti alle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio regionale	pag. 7
- Andamento delle precipitazioni ed indice SPI medio zonale riferiti a ciascuna delle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio regionale	pag. 8
- Condizioni di innevamento delle Dolomiti e Prealpi Venete	pag. 16
- Equivalentente in acqua del manto nevoso per il bacino del Piave	pag. 17
- Situazione del Lago di Garda	pag. 18
- Volumi invasati nei principali serbatoi del Veneto	pag. 19
- Situazione acque sotterranee	pag. 20
o livelli di falda per alcune delle stazioni di monitoraggio maggiormente rappresentative della pianura veneta	pag. 21
- Situazione dei corsi d'acqua	pag. 25
o diagrammi delle portate medie giornaliere negli anni idrologici 2002-03, 2005-06, 2008-09, 2011-12, 2015-16 e 2016-17 confrontati con il periodo corrente	pag. 26
- Temperatura giornaliera rilevata su quattro stazioni di monitoraggio rappresentative dell'area montana e di pianura	pag. 31

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SERVIZIO CENTRO SERVIZI IDROGEOLOGICI
Dipartimento Regionale per la sicurezza del territorio